

PROTEGGI IL TUO ALLEVAMENTO!



Le misure di biosicurezza sono fondamentali per **difendere il proprio allevamento dall'ingresso accidentale di patologie, diminuire i cali di produzione e le perdite economiche e garantire la produzione di alimenti sicuri e salubri anche attraverso la riduzione del consumo di farmaco.**



STRUTTURE E LOCALI

Devono essere in buono stato di manutenzione, facilmente lavabili e disinfettabili; l'area di allevamento deve essere delimitata da recinzione continua e completa; ogni capannone deve avere una dogana danese all'ingresso.



ANIMALI MORTI

Vengono raccolti giornalmente e stoccati in celle di congelamento con capienza proporzionale alla capacità produttiva dell'allevamento.



VUOTO BIOLOGICO e SANITARIO

L'accasamento di nuovi volatili deve avvenire dopo un periodo di vuoto biologico (per allevamento o per capannone) che varia a seconda della specie allevata. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione è obbligatorio un vuoto sanitario di almeno 3 giorni.



INFESTANTI

Deve essere adottato un piano di derattizzazione e disinfestazione e adeguate misure di prevenzione ed esclusione dei selvatici.



MANGIME E ACQUA

Sia le materie prime sia il mangime devono essere stoccati evitando contaminazioni; i silos devono essere lavati e disinfettati periodicamente.



REGISTRAZIONI

Tutti gli allevamenti devono registrare giornalmente la mortalità su apposito registro. Ogni discostamento dai normali parametri produttivi (consumo acqua, mangime, produzione uova, crescita giornaliera, livello di mortalità) deve essere prontamente segnalato.



MOVIMENTAZIONI

L'allevamento deve essere strutturato in modo da non consentire l'accesso deliberato di estranei. Gli ingressi dall'esterno devono essere ridotti al minimo. Chi è autorizzato ad entrare in allevamento (visitatori, fornitori mangime, etc.) deve essere registrato e deve adottare comportamenti adeguati.



LETTIERA VERGINE E POLLINA

La lettiera vergine viene stoccata senza contatto con infestanti. La pollina deve essere conservata in ricoveri coperti con pavimento impermeabile.

SAI RICONOSCERE I SINTOMI DELL'INFLUENZA AVIARIA?

Febbre, depressione, mancato consumo del cibo, piume arruffate, riduzione assunzione acqua, mortalità modesta, oppure morte improvvisa senza sintomi apparenti.

GALLINE

Posizione accovacciata o eretta in stato semi-comatoso, con la testa che tocca il suolo. Cianosi ed edema di cresta e bargigli (colore violaceo e gonfiore) con possibile presenza di petecchie ed ecchimosi emorragiche sulla punta.

Respirazione difficoltosa e lacrimazione abbondante. Diarrea acquosa e sete eccessiva dei malati.

Deposizione: inizialmente uova dal guscio morbido, poi interruzione.

POLLI da CARNE

Segni meno evidenti rispetto ad altri avicoli. Depressione grave e alta mortalità.

Edema facciale (gonfiore), al collo e segni neurologici (collo piegato, difficoltà a camminare, etc.).

TACCHINI

Segni simili a quelli dei polli da carne.

ANATRE

E' possibile che non presentino sintomi clinici.